

Bringing the public voice to the public

Danny Darche
Vaccine Advocate, Father of Lore*

From package to protection: how do we close global coverage gaps to optimize the impact of vaccination?

22-24 September 2014 - Les Pensières Annecy- French Alps


Lore

Aug 17 - Nov 7 2010



Sources of infants' whooping cough infection

- Parents : +/- 55 %
- Brothers & sisters : 16-25 %
- Friends, cousins, others : 10-24 %
- Aunts, Uncles : 10 %
- Grandparents : +/- 6 %
- Caregivers : 2 %



**Household
is responsible
for
+/- 80 % !!!**

(Source : CDC "Surround babies with protection")

2009 Prevention Campaign “Whooping Cough”




PROTECT YOUR BABY
AGAINST
WHOOPING COUGH

GET VACCINATED
TOO

2010 Prevention Campaign “Pregnancy & Vaccination”


Nog niet zwanger, maar wel plannen?

- ▶ Laat door uw arts nakijken of u volledig gevaccineerd bent. Een aantal courante vaccins beschermen tegen verschillende besmettelijke of gevaarlijke ziektes. Als u eenmaal zwanger bent, kunnen bepaalde vaccins niet meer toegediend worden. Volledige vaccinatie vóór de zwangerschap is dus het meest aangewezen.



▶ Laat in elk geval controleren of u voldoende beschermd bent tegen mazelen, bof en rodehond (rubella). Uw arts kan nakijken of u voldoende antistoffen tegen rodehond hebt en zal u mogelijk een extra vaccinatie geven. Rodehond kan ernstige gevolgen hebben voor de baby, zoals gehoorschade. Na deze vaccinatie kunt u het best nog een maand wachten vóór u zwanger probeert te worden.

▶ Laat nakijken of iedereen van uw gezin - ook uw partner - voldoende gevaccineerd is, zeker tegen kinkhoest. Ook andere gezinsleden kunnen uw baby kort na de geboorte besmetten.



Proficiat, u bent zwanger!

- ▶ Als u al zwanger bent, kunnen bepaalde vaccins nodig zijn. Ze kunnen veilig toegediend worden, zonder gevaar voor uw baby.
- ▶ Laat nakijken of u voldoende gevaccineerd bent tegen difterie, tetanus en kinkhoest. Als dat niet het geval is, laat u zich het best nog vaccineren. Zo vermijdt u dat u uw baby kort na de geboorte besmet. Jonge baby's zijn erg vatbaar voor kinkhoest en worden pas voor het eerst gevaccineerd op de leeftijd van acht weken.
- ▶ Bent u zwanger tijdens het griepseizoen (begin oktober tot eind februari)? Laat u dan vaccineren tegen griep vanaf zestien weken zwangerschap. Zodra u zestien weken zwanger bent, is het risico om zwaar ziek te worden door griep veel groter dan normaal. Bovendien kan een ernstige griep ook gevolgen hebben voor uw zwangerschap of voor uw baby.
- ▶ Sommige mensen zijn besmet met hepatitis B zonder dat ze het weten. Laat u testen door uw arts. Bij hepatitis B is het cruciaal zo snel mogelijk maatregelen te nemen om de baby na de geboorte te beschermen.

Zwanger met vakantiek?


Plant u een verre reis tijdens uw zwangerschap? Vraag aan uw arts of er voor het gebied waar u naartoe gaat, bepaalde reisvaccinaties nodig zijn. Ook als u zwanger bent, kunnen sommige vaccins nog veilig worden toegediend, andere echter beter niet.

Bent u al bevallen?

- ▶ Laat nakijken of u volledig gevaccineerd bent.
- ▶ Zo nodig kunt u zich na de bevalling alsnog laten vaccineren tegen mazelen, bof en rodehond (rubella). En vergeet de kinkhoestvaccinatie niet.
- ▶ Start op tijd met de vaccinatie van uw baby; begin acht weken na de geboorte. De bescherming die een baby meekrijgt van de moeder is snel uitgewerkt. Bovendien duurt het een tijdje voor een baby volledig beschermd is na de eerste vaccinatie. Het is dus belangrijk om de vaccinaties op tijd te starten.

Alle informatie op het net

Op de website www.vaccinatieweek.be vindt u alle informatie over vaccinatie en zwangerschap; uitleg over de vaccins, over de ziekten waartegen ze beschermen, over veiligheid, het vaccinatieschema voor uw baby ...



You're pregnant ?
Congratulations !

Please get a dTap
booster during the
pregnancy to protect
your baby just after
delivery.
Babies are particularly
vulnerable the first
two months.

HEALTH
AUTHORITIES

HCP


UNIVERSITY
OF GOOGLE

???

ANTIVAX

PUBLIC

The worldwide most famous picture of whooping cough



Source : Wikipedia

The real face of whooping cough



“Listen to the sound of pertussis, show what pertussis really is, that’s something that no one will never ever forget.

It says so much more than a chart in a powerpoint presentation.

Don’t be embarrassed with this, it may be shown”

FLANDERS ACTION PLAN 2012 - 2020

- By 2014, newborns should be protected against whooping cough by a systematic cocoon vaccination of the family.
- By 2014, a new central website will be created for HCP, containing all info about vaccinations, vaccines, side effects, vaccination policy, ...
- By 2015, the MMR vaccination rate must be at least 95%
- By 2016, at least 80% of the kids under 18 months must be vaccinated in due course
- By 2017, everyone will be able to consult his own vaccination data on “Vitalink“
- By 2020, at least 80 % of caregivers working with babies must have got their w/c booster
- By 2020, at least 80 pct of the medical profession should be vaccinated against flu
- By 2020, at least 75 pct of our 65+ has to be vaccinated against flu
- By 2020, at least 50 pct of pregnant women has to be vaccinated against flu
- By 2020 a sufficient vaccination rate should be reached at all ages to assure a good herd immunity
- By 2020 the new setup vaxpolicy will follow each one all life long, not only during the childhood
- ...

Source : Zorg & Gezondheid.be (Flemish Agency for Care & Health)
gezondheidsconferentie-vaccinaties.be

Belgian w/c vaccination's new guidelines

(summary)

1. Vaccination of the mother during EACH pregnancy between week 24 and week 32
2. Vaccination of each member of the family preferably before delivery
3. Strict respect of the children's vaccination schedule
4. Vaccination of all adults in general
5. Breast-feeding is not a reason not to vaccinate

Source : Belgian Superior Health Council (HGR/CSS)



**GUST,
1 MONTH OLD
AND ALREADY 4 MONTHS
PROTECTED AGAINST
WHOOPIING COUGH**

Whooping cough affects more and more young babies

Pregnant?

Get your FREE vaccine and protect your child

Source : Zorg & Gezondheid.be (Flemish Agency for Care & Health)

Chickenpox vaccine advocacy site



VZW **ESTW**
Eline's strijd tegen windpokken

U bevindt zich hier: Home

Main Menu

- Home
- Wie zijn wij
- Contact gegevens
- Wat zijn windpokken
- Risico's - complicaties
- Zwangerschap
- Vaccinatie
- Verzorging windpokken
- Getuigenissen
- Hoe zit het in het buitenland?
- Activiteiten
- Eline's Song
- Interessante links
- Vraag & Antwoord
- Zona
- Pers
- Sponsoring
- Blog

Home

Er zijn reeds 5 kinderen in Vlaanderen overleden door complicaties !!!!
(periode januari 2014 – april 2014)
Vaccineer en bescherm uw kind !

Wist u dat windpokken (ook gekend als waterpokken of varicella) géén onschuldige kinderziekte is ?
Wist u dat elk jaar honderden gezonde kinderen in België gehospitaliseerd worden door complicaties ?

Wist u dat u uw kind kunt beschermen door een eenvoudige vaccinatie, welke vb in de USA al sinds 1995 in het vaccinatieschema zit, en in België wordt tegengehouden (vooral door het kostenplaatje) ?

Wij nodigen u graag uit op 1 van onze komende info avonden !

Info avonden

***** september 2014 : GRATIS info avond LIMBURG *****

Locatie : volgt nog

Details en inschrijvingen : zie 'activiteiten'

A STUDY LINKING AUTISM TO CHILDHOOD VACCINATIONS HAS NOT ONLY BEEN DEBUNKED, BUT IT IS AN "ELABORATE FRAUD." WE TRUST THAT THIS ENDS THE MATTER.



CARLSON ©2011
UNIVERSAL UOJACK
CARLSONTOONS.COM



Thank You

Baby Lore

*Give whooping cough no chance
Geef kinkhoest geen kans
La coqueluche, ne lui laissez pas de
chance*

facebook

- Danny Darche
- Coqueluche Sensibilisation
- Kinkhoest Sensibilisering

twitter

- DannyDarche

<http://loredarche.be>

info@loredarche.be

